

TRATAMIENTO DE LA NEUMONÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Amoxicilina-Ac. Clavulánico

Indicación: fármaco de primera elección.
 Dosis: 90-100 mg/Kg/día. Dar cada 8 horas.
 Dosis máxima: 2 gramos/día.^{1,2}
 Duración del tratamiento: 10 días.
 Presentación: suspensión oral de 100/12.5. (5 ml = 500 mg).

Peso en Kilos	Amoxicilina-clavulánico (100/12.5) ml en cada dosis:	
7	2,1	
8	2,4	
9	2,7	
10	3	
11	3,3	
12	3,6	
13	3,9	
14	4,2	
15	4,5	
16	4,8	
17	5,1	
18	5,4	
19	5,7	
20	6	
21	6,3	
22	6,6	
23	6,6	+
24	6,6	+
25	6,6	+
26	6,6	+
27	6,6	+
		Añadir amoxicilina (suspensión de 250 mg) ml en cada dosis:
		0,6
		1,2
		1,8
		2,4
		3
		Añadir amoxicilina (sobres de 500 mg) Cantidad por dosis:
28	6,6	- 1 sobre
≥ 28	6,6	1 sobre

Nota: Los pacientes menores de un año con neumonía deben ser derivados al hospital por ser criterio de ingreso. Para prescribir dosis altas de Amoxicilina-Ác. clavulánico (90-100 mg/kg/día), sólo se utilizará la presentación: suspensión oral 100/12,5 (Augmentine® 100). 5 cc = 500 mg.

Bibliografía

1. The Harriet Lane Handbook. Seventeenth Edition. Elsevier Mosby. 2005:714.
2. Taketomo C, Jana H, Donna M. Pediatric Dosage Handbook. 15ª Edition 2008-2009.

¡ERROR!

TRATAMIENTO DE LA NEUMONÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Amoxicilina-Ac. Clavulánico

Indicación: **fármaco de primera elección.**

Dosis: 90-100 mg/Kg/día. **Dar cada 8 horas.**

Dosis máxima: 2 gramos/día.^{1,2}

Duración del tratamiento: **10 días.**

Presentación: suspensión oral de 100/12.5. (5 ml = 500 mg).

Peso en Kilos	Amoxicilina-clavulánico (100/12.5) ml en cada dosis:		
7	2,1	(si tiene > 1 año de edad)*	
8	2,4		
9	2,7		
10	3		
11	3,3		
12	3,6		
13	3,9		
14	4,2		
15	4,5		
16	4,8		
17	5,1		
18	5,4		
19	5,7		
20	6		
21	6,3		
22	6,6		
23	6,6	+	0,6
24	6,6	+	1,2
25	6,6	+	1,8
26	6,6	+	2,4
≥ 28	6,6	+	3,4

Añadir amoxicilina
(suspensión de 250 mg)
ml en cada dosis:

Nota: Los pacientes menores de un año con neumonía deben ser derivados al hospital por ser criterio de ingreso. Para prescribir dosis altas de Amoxicilina-Ác. clavulánico (90-100 mg/kg/día), sólo se utilizará la presentación: suspensión oral 100/12,5 (Augmentine® 100). 5 cc = 500 mg.

CORRECTO

Bibliografía

1. The Harriet Lane Handbook. Seventeenth Edition. Elsevier Mosby. 2005:714.
2. Taketomo C, Jana H, Donna M. Pediatric Dosage Handbook. 15ª Edition 2008-2009.