



Servicio Canario de la Salud
Complejo Hospitalario
Universitario
Insular – Materno Infantil

Información farmacológica al paciente pediátrico

Información destinada a padres y/o cuidadores




¿Cómo puedo dosificar la CEFUROXIMA-AXETILO a partir de los sobres de 250 mg?

Recientemente la Agencia Española del Medicamento nos ha comunicado el desabastecimiento de la suspensión de cefuroxima-axetilo (zinnat®).

Una alternativa para la correcta dosificación es hacerlo a partir de los sobres de 250 mg

¿CÓMO TOMAR UNA DOSIS DISTINTA A LA DEL sobre de 250 mg

- Abra el sobre y vierta el contenido en un vaso de cristal.
- Coja una jeringa y llénela con agua hasta 10 ml.
- Vierta esos 10 ml en el vaso de cristal.
- Agite vigorosamente la mezcla, hasta que se forme una suspensión uniforme.
- Coja el volumen correspondiente a la dosis prescrita. Tu médico o farmacéutico te indicará la cantidad que debe coger*.



- Tómelo inmediatamente.
- Deseche el resto de la mezcla. No la guarde.
- Se aconseja tomar la medicación junto con las comidas.

*Información para el personal sanitario: la concentración final de la suspensión es de **20 mg/ml**, debido a una expansión del volumen.

Paciente:

Dosis prescrita: _____

Mililitros: _____

Médico prescriptor

Fecha y firma

Fecha elaboración: febrero de 2015